



بررسی روند صید ۵ گونه مهم تجاری صید شده توسط تور گوشگیر در صیدگاه‌های سواحل خلیج- فارس و دریای عمان در بازه زمانی ۵ ساله

محبوبه میرزائی، سید یوسف پیغمبری^{۲*}، پرویز زارع^۳، رضا عباسپور نادری^۴

۱، ۲، ۳. گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

۴. معاونت صید و بهره‌برداری آبزیان، سازمان شیلات ایران، تهران

*مسئول مکاتبات: sypaighambari@gau.ac.ir

چکیده

در این مطالعه روند صید ماهی‌های شوریده (*Otolithes ruber*)، سنگسر معمولی (*Pomadasys kaakan*)، هامور معمولی (*Epinephelus coioides*)، حلواسیاه (*Parastromateus niger*) و شانک (*Acanthopagrus latus*) در سواحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از مطالعات میدانی صورت گرفته توسط سازمان شیلات ایران در طی سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۹۹) جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج نوساناتی در میزان صید این گونه‌ها مشاهده گردید. در ماهی شوریده بیشترین میزان صید در استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ و کمترین آن در استان خوزستان در سال ۱۳۹۵ ثبت گردید. در ماهی سنگسر بیشترین میزان صید در تمامی سال‌ها در استان سیستان و بلوچستان ثبت گردید و به جز سال ۱۳۹۵ که استان خوزستان رتبه دوم میزان صید سنگسر را داشت در دیگر سال‌ها در استان خوزستان کمترین میزان صید این گونه ثبت گردید. در ماهی حلواسیاه و هامور بیشترین میزان صید در تمامی سال‌ها در استان سیستان و بلوچستان ثبت گردید و کمترین میزان صید آن در همه سال‌ها به جز ۱۳۹۹ در استان خوزستان و این حداقل میزان صید برای ماهی هامور در سال ۱۳۹۸ با یک کاهش آشکاری نسبت به دیگر استان‌ها در استان بوشهر و همچنین کمترین میزان صید ماهی حلواسیاه در سال ۱۳۹۹ در استان بوشهر ثبت گردید. در ماهی شانک بیشترین میزان صید در همه سال‌ها به جز ۱۳۹۹ که کاهش محسوسی داشت در استان سیستان و بلوچستان مشاهده گردید. کمترین صید ماهی شانک طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان بوشهر و طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ در استان هرمزگان ثبت گردید.

واژگان کلیدی: روند صید، گونه‌های تجاری، خلیج فارس، دریای عمان.